



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
„ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”

вул. Грибоєдова, 20-г, м. Ужгород, 88017, тел., факс: 64-07-25
E-mail: uzh.labcentr@gmail.com, код ЄДРПОУ 38533513

15.09.2022 р. № 2058

Голові
Ужгородської районної
Адміністрації,
Начальнику
Ужгородської РВА
Радіону КІШТУЛИНЦЮ

Головам об'єднаних
територіальних громад

В Україні триває кампанія по форсованій імунізації проти поліомієліту дитячого населення. Щеплення проти поліомієліту проводяться в усіх АЗПСМ територіальних громад.

З метою якнайбільшого залучення батьків до вакцинації проти поліомієліту дітей підлягаючих вікових категорій просимо Вас розмістити на сайтах матеріали, що додаються.

Директор

Олександр ПШЕНИЧНИЙ

Байда

Вх. № 1924
«15» 09 2022

ОБЕРЕЖНО - ПОЛІОМІЄЛІТ

Наголошуємо: для всіх нещеплених дітей вакцинація – єдиний надійний захист від невиліковного паралічу, який може спричинити поліомієліт.

Поліомієліт — високозаразне вірусне захворювання, що може викликати невиліковний параліч і призвести до смерті. Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиним захистом є вакцинація.

Нагадаємо, спалах поліомієліту в Україні зафіксували наприкінці 2021 року. Вірус поліомієліту продовжує циркулювати у навколишньому середовищі та становить значну небезпеку.

Основними симптомами поліомієліту є лихоманка, втома, головний біль, нудота, блювання та діарея. Вірус, що викликає захворювання, передається від людини до людини через забруднену воду, продукти, брудні руки тощо, тобто найчастіше при тісному контакті в громаді. Приблизно в 1 з 200 випадків при інфікуванні розвивається незворотній параліч кінцівок. 5-10% таких людей помирають через параліч дихальних м'язів.

В Україні вакцинацію дітей для профілактики поліомієліту здійснюють у віці 2 та 4 місяці інактивованою поліомієлітною вакциною та у 6, 18 місяців і 6, 14 років оральною вакциною із ослабленим вірусом. Якщо дитина не щеплена проти поліомієліту, то потрібно негайно отримати як мінімум 3 дози вакцини із інтервалом 1 місяць між кожною з доз.

Кожна не вакцинована або не повністю вакцинована дитина залишається в небезпеці.

Звертаємось до всіх батьків дітей віком від 6 місяців до 6 років із наполегливим проханням обов'язково якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря, який перевірить вакцинальний статус дитини, та спланувати проведення необхідних профілактичних щеплень від поліомієліту для запобігання захворювання на цю невиліковну хворобу.

Довідково. За інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 6 місяців 2022 року з усіх дітей до 1 року лише 33,3% отримали своє щеплення від поліомієліту. Цього мало для колективного імунітету.

Не набагато більший і показник охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей від 1 року:

1,5 року (18 місяців) — 33,5%;

6 років — 33,2%;

14 років — 28,6%.